



VANSIL

saúde animal

EQUINOS

ANTIBIÓTICOS

Agrosil® 6 Milhões

Penicilinas (Procaína, Benzatina e Potássica) + Estreptomicina

Indicações de uso:

Garrotilho, Pneumonia, Septicemia dos potros e Artrite.

Posologia e modo de uso:

1 ml / 30 a 40 kg de peso (Intramuscular) durante 3 a 5 dias.

Apresentação:

Display com 25 frascos e 25 ampolas diluentes



Agrosil® 5 Mega

Penicilinas (Procaína e Potássica) + Piroxican

Indicações de uso:

Garrotilho, Pneumonia, Septicemia dos potros e Artrite.

Posologia e modo de uso:

1 ml / 10 a 25 kg de peso (Intramuscular) durante 3 a 5 dias.

Apresentação:

Display com 25 frascos e 25 ampolas diluentes



Agrosil PPU® 25.000.000 milhões

PRONTO PARA USO

Penicilinas (Procaína e Benzatina) + Estreptomicina

Indicações de uso:

Tratamento de infecções bacterianas em geral. Profilaxia das infecções nas castrações, pré e pós operatório e demais intervenções cirúrgicas.

Posologia e modo de uso:

Homogeneizar antes do uso.

Administrar 1 ml para cada 20 kg de peso, em dose única ou a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco-ampola de 50 ml.



Neocolin Líquido®

Neomicina - 35mg / ml

Indicações de uso:

Tratamento e profilaxia de gastroenterites e metrites.

Posologia e modo de uso:

Via oral: 1 ml / 4 kg de peso durante 3 a 5 dias consecutivos.

Via intrauterina: 60 ml de Neocolin em 40 ml de soro fisiológico. Infundir durante 2 a 3 dias. Alterações na posologia a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco com 480 ml



Gentasil®

Gentamicina - 440mg / 10ml

Indicações de uso:

Tratamento de septicemias, mastites, gastroenterites, metrites, endometrites e em pós operatórios em geral.

Posologia e modo de uso:

Via intramuscular: Aplicar 1 ml / 10 kg de peso no primeiro dia e 1 ml / 20 kg de peso nos dias subsequentes.

Via intrauterina: 10 a 60 ml por 3 dias consecutivos.

Apresentação:

Frasco com 50 ml



Gentamicina Vansil®

Gentamicina - 440mg / 10ml

Indicações de uso:

Tratamento de septicemias, mastites, gastroenterites, metrites, endometrites e em pós operatórios em geral.

Posologia e modo de uso:

Via intramuscular: Aplicar 1 ml / 10 kg de peso no primeiro dia e 1 ml / 20 kg de peso nos dias subsequentes.

Via intrauterina: 10 a 60 ml por 3 dias consecutivos.

Apresentação:

Frasco-ampola com 100 ml



Silmetrin®

Sulfa+Trimetoprim em pó - Uso Oral

Indicações de uso:

Profilaxia das infecções cirúrgicas e tratamento de pneumonias, enterites, mastites, septicemias, bronquite infecciosa, infecções geniturinárias e podais.

Posologia e modo de uso:

Tratamento individual: 3 g / 10 kg de peso.

Tratamento coletivo: 100 g (um sachê) diluídos em 25 litros de água ou em 50 kg de ração. Doses diárias, por 3 a 5 dias consecutivos, sob orientação do Médico Veterinário.

Apresentação:

Display de 12 sachês com 100 g



Tridiazin®

Sulfa+Trimetoprim - Injetável, pronto para uso.

Indicações de uso:

Profilaxia das infecções cirúrgicas e tratamento de pneumonias, enterites, mastites, septicemias, bronquite infecciosa, infecções geniturinárias e podais.

Posologia e modo de uso:

1 ml / 30 kg de peso (Intramuscular) por 3 dias.


Apresentações:

Frascos com 15 e 50 ml



Hiprosil[®]

Tratamento e prevenção da EPM
Confiança e eficácia comprovada



Hiprosil[®]

Diclazuril associado à vitaminas
Tratamento e prevenção da EPM


Indicações de Uso:

Tratamento e prevenção da Mieloencefalite Protozoária Equina (EPM/MEP) ou "Bambeira dos gambás", causada por *Sarcocystis neurona* ou *Neospora hughesi*.

Posologia e modo de uso:

Dose terapêutica: 1g para cada 20 Kg de peso (equivalente a 5 mg/ Kg de peso)
Administrar por no mínimo 28 dias consecutivos. O tratamento poderá ser prolongado, de acordo com a evolução clínica da doença, conforme a avaliação do médico veterinário.

Apresentação: Display com 7 seringas graduadas de 30 g.



ANTIINFLAMATÓRIOS

Silcort®

Anti-inflamatório, analgésico e antipirético injetável à base de Isoflupredona

Indicações de uso:

Controle da dor, febre e inchaço nas enfermidades musculares, articulares e ósseas, tais como: miosites, artrites, osteoartrites, fraturas, luxações, laminites, toxemia desencadeada nos casos de pneumonias, mastites, endometrites e gastrites traumáticas. Reações alérgicas e choques anafiláticos. Adjuvante nos casos de paresia pós parto, retenção placentária, acidentes ofídicos e demais condições de estresse.

Posologia e modo de uso:

Via Intramuscular: 5 a 10 ml a cada 12 ou 24 horas.

Via Intrasinovial: 2,5 a 10 ml

Administrar sob orientação do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco com 10 ml



Alumex®

Analgésico, anti-inflamatório e descongestionante tópico

Indicações de uso:

Analgesia nas síndromes dolorosas em artrites, miosites, sinovites, luxações, entorses e contusões.

Posologia e modo de uso:

Aplicar uma fina camada sobre a região afetada e massagear suavemente até o alívio da sensação dolorosa, 2 a 3 vezes ao dia até a melhora do quadro. Obs: Evitar as mucosas (boca, narinas, olhos e órgãos genitais), não aplicar em feridas abertas e queimaduras.

Apresentação:

Bisnaga com 100 g e pote com 500g

NO DOPPING



Fenilvet®

Fenilbutazona (20%)

Indicações de uso:

Analgésico antipirético e anti-inflamatório indicado em todos os processos inflamatórios musculares e articulares, edemas de úbere, mastites, metrites e pneumonia.

Posologia e modo de uso:

1 ml / 50 kg de peso (Endovenosa). A critério do Médico Veterinário.

Apresentações:

Frascos com 20 e 100 ml



Reumatosol®

Anti-inflamatório tópico

Indicações de uso:

Possui efeito anti-inflamatório no tratamento de reumatismo agudo ou crônico e em todos os processos inflamatórios articulares e tendíneos, claudicações, entorses, contusões, luxações, higromas e inflamações ganglionares.

Posologia e modo de uso:

Aplicar na região afetada e massagear para completa absorção, duas vezes ao dia. Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco spray 100 ml



SUPLEMENTOS

Arsenatrol®

Estimulante orgânico injetável (Ferro + Arseniato)

Indicações de uso:

Tônico geral na convalescência de doenças infecciosas dos equídeos. Nas anemias ferroprivas em consequência de parasitoses e infecções. Na inapetência (falta de apetite). Em cavalos de esporte e de trabalho como estimulante na formação dos glóbulos vermelhos.

Posologia e modo de uso:

Aplicar lentamente por via endovenosa ou pela via intramuscular profunda nas seguintes doses em intervalo de 3 dias:

| Doses | 1ª | 2ª | 3ª |
|---------|-------|-------|---------|
| Adultos | 15 ml | 20 ml | 25 ml |
| Potros | 10 ml | 13 ml | 16,5 ml |

Apresentação:

Diplay com 3 frascos de 20 ml



Glicose Vitaminada Vansil®

Glicose injetável (25%) + Vitaminas C e B1

Indicações de uso:

Estimulante circulatório, cardíaco e diurético. Na inapetência provocada por estados infecciosos, nas desidratações orgânicas por diarreias, nas intoxicações devidas a alimentos e produtos químicos, nos estados convulsivos de origem nervosa, nos fenômenos paralíticos e debilidades musculares.

Posologia e modo de uso:

Aplicar por via endovenosa nas seguintes doses:

Equinos adultos: 40 a 80 ml.

Potros: 20 a 40 ml.

Doses diárias. Período de tratamento conforme orientação do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frascos-ampola com 100 ml



Vitasil Energy®

Suplemento vitamínico e aminoácido

Indicações de uso:

Suplementação de vitaminas do complexo B, Ácido Fólico e aminoácidos para as fases de crescimento e manutenção.

Modo de uso:

Equinos adultos: 20 ml

Potros: 5 ml

Doses diárias diretamente na boca ou misturado à ração sob orientação do Técnico Especializado.

Apresentações:

Frasco com 1 litro e 5 litros



Creatina Vansil Super E®

Creatina (80%) + Vitamina E

Indicações de uso:

Para cavalos atletas, em treinamento ou competição, auxiliando nos exercícios.

Modo de uso:

Fornecer 75 g diariamente por 90 dias.

Após este período, suspender fornecimento por 30 dias e reiniciar suplementação.

Apresentação:

Sachê com 500 g e frasco com 2 kg

Acompanha medida dosadora de 10 g.



NO DOPPING

Aroma de Baunilha

SUPLEMENTOS

Evolution M.O.®

Colabora com o metabolismo orgânico valorizando o desempenho do animal

Indicações de uso:

Evolution M.O. é indicado como suplemento vitamínico aminoácido mineral nas situações de estresse, como preparatório para exposições e competições.

Modo de uso:

Jovens: Administrar uma seringa (40 g) a cada 15 dias.

Adultos: Administrar duas seringas (80 g) a cada 15 dias.

Alterações no modo de uso a critério do Técnico Especializado.

Apresentação:

Display com 2 seringas graduadas de 40 g



NO DOPPING

Vitasil Mix®

Suplemento mineral, vitamínico e aminoácido com probióticos

Indicações de uso:

Suplemento vitamínico aminoácido e mineral nas situações de estresse como preparatório para exposições e competições.

Modo de uso:

Adultos: Manutenção: Administrar 40 g ao dia.

Treinamento: Administrar 100 g ao dia.

Potros e Pôneis: Administrar 30 g ao dia.

Alterações no modo de uso a critério do Técnico Especializado.

Apresentação:

Balde com 2,5 kg com medidor graduado



Biomaster® 2.5 g

Biotina, Zinco, Enxofre, Lisina, Metionina e Ácido Fólico

Indicações de uso:

Biomaster tem em sua formulação os elementos essenciais para auxiliar na boa formação dos cascos.

Modo de uso:

Misturar à ração em doses diárias.

Suplementação individual:

Equinos adultos: 10 g

Potros e: 5 g

Suplementação coletiva: 1 kg em 1.000 kg de ração ou 20 kg de suplemento mineralizado.

Apresentação:

Frasco com 500 g com medida dosadora de 10 g



Horse Energy®

Suplemento mineral, vitamínico e aminoácido, em pasta

Indicações de uso:

Para equinos submetidos a trabalho intenso, animais de esporte, estresse de viagem, reprodução e exposições.

Modo de uso:

1g para cada 20 kg de peso, 1 vez ao dia.

Nas competições, fornecer Horse Energy 1 hora antes do início das provas.

Apresentação:

Display de 5 seringas graduadas com 30 g cada



NO DOPPING

TERAPÊUTICOS

Óleo Canforado Vansil®

Estimulante cardíaco e respiratório injetável - Cânfora (20%)

Indicações de uso:

Excitante e estimulante cardíaco e dos centros vasomotores e respiratório.

Posologia e modo de uso:

Aplicar por via intramuscular profunda nas seguintes dosagens:

Equinos adultos: 15 a 30 ml

Período de tratamento conforme orientação do Médico Veterinário.

Apresentação:

Display com 12 frascos com 20 ml



Cálcio Reforçado Vansil®

Cálcio injetável + Magnésio + Sódio + Glicose

Indicações de uso:

Tratamento de hipocalcemia antes, durante e após o parto, e durante a lactação (nas paresias, paralisias e tetanias das pastagens). Estados alérgicos (eczemas, urticárias e choques medicamentosos), intoxicação. Osteodistrofias (osteoporose, osteofibrose, raquitismo, osteomalácia e cara inchada), Acetonemias, perturbações do metabolismo mineral e fraturas ósseas.

Posologia e modo de uso:

Vias subcutânea e endovenosa.

Equinos adultos: 150 a 250ml

Potros: 20 a 50ml

Apresentação:

Frascos de 200 e 500 ml



ANTIPARASITÁRIOS

Mebendasil Pasta®

Vermifugo de largo espectro - Mebendazole (14,67%)

Indicações de uso:

Controle de *Strongylus* spp (grandes e pequenos), *Parascaris equorum*, *Triodontophorus* spp, *Oesophagostomum* spp, *Trichostrongylus* spp, *Oxyuris equi*, *Trichonema* spp e *Strongyloides westeri*.

Posologia e modo de uso:

3 g pasta para cada 50 kg de peso em dose única.

Apresentação:

Seringas graduadas contendo 30 g



Oxiuris equi



Strongylus ssp



Parascaris equorum

Triclorsil Pasta®

Vermifugo e ectoparasitário de largo espectro
Mebendazole (14,67%) + Triclorfon (50%)

Indicações de uso:

Controle de *Strongylus* (grandes e pequenos), *Parascaris equorum*, *Triodontophorus* spp, *Oesophagostomum* spp, *Trichostrongylus* spp, *Oxyuris equi*, *Trichonema* sp e *Strongyloides westeri*. Controla ainda larvas de 1ª, 2ª e 3ª estágios de *Gasterophilus intestinalis*, *Gasterophilus nasalis* e formas adultas de *Habronema* spp.

Posologia e modo de uso:

3 g de pasta para cada 50 kg de peso em dose única.

Apresentação:

Seringas graduadas contendo 30 g



Oxiuris equi



Strongylus ssp



Parascaris equorum



Habronema sp



Gasterophilus sp



Triclorsil®

Endectocida em pó à base de Triclorfon (98%)

Indicações de uso:

Controle de parasitas em animais domésticos tais como: Bernes (larva de *Dermatobia hominis*), *Gasterophilus*, *habronemose* (Gástrica e Cutânea), moscas, piolhos, sarnas, pulgas dos animais domésticos e moscas das instalações.

Posologia e modo de uso:

Via Oral: 3 a 4 g para cada 100 kg de peso em dose única. Para tratamento coletivo misturar 1 g / 10 kg de peso no sal mineralizado por 3 dias consecutivos.

Pulverização: Diluir 150 g em 40 litros ou 500 g em 125 litros de água e pulverizar individualmente os animais com 3 litros da solução. Repetir aplicação 7 dias após.

Combate no ambiente: Diluir 20 g em 10 litros de água e pulverizar as instalações (baías e cocheiras).

Apresentações:

Display de 25 sachês com 20 g e embalagem com 150 e 500 g



Sarnas



Piolhos



Dermatobia hominis (Beme)

Cypermeit®

Cipermetrina (10%) + Butóxido de Piperonila (10%)

Indicações de uso:

Controle de ectoparasitas no ambiente tais como: mosca do Estábulo (*Stomoxys calcitrans*), mosca doméstica (*Musca domestica*), sarnas (*Psoroptes*) e piolhos (*Linognathus* sp).

Posologia e modo de uso:

Instalações: 60 ml / 20 litros de água. Pulverizar pisos, paredes e equipamentos.

Apresentação:

Frasco com 1 litro



Piolhos



Musca domestica



Sarnas



Stomoxys calcitrans



Citronat®

Repelente natural à base de Óleo de Citronela (20%)

Indicações de uso:

Para aliviar o incômodo causado pelos insetos.

Posologia e modo de uso:

Aplicar uma fina camada sobre o pelo dos animais.

Apresentação:

Frasco spray com 500 ml



Mosca domestica



Chrysopa variegatus



Stomoxys calcitrans



Melophagus olearius



Tabanus bovinae



NO DOPPING

Vetomil®

Mosquicida ambiental à base de Metomil (1,25%)

Indicações de uso:

Controle ambiental de insetos como, *Musca domestica* e *Stomoxys calcitrans* (mosca dos estábulos) presentes em instalações Industriais (matadouros, laticínios, charqueadas e cortumes) e rurais (estábulo, cocheiras, pocilgas, granjas, etc). Controle de formigas domésticas.

Posologia e modo de uso:

Agitar o produto para homogeneizar a suspensão. Diluir 1 litro de Vetomil / 10 litros de água e pulverizar paredes, pisos e equipamentos. Utilizar a solução diluída por completo.

Apresentação:

Frascos com 250 ml, 1 litro e 5 litros



Musca domestica



Stomoxys calcitrans



ANTIPARASITÁRIOS / CICATRIZANTES

Max Prata®

Cicatrizante, matabicheiras, bernicida, repelente, antisséptico e hemostático

Indicações de uso:

Profilaxia e tratamento de miíases (larvas de *Cochliomyia hominivorax*), infecções de umbigo, abscessos, feridas cirúrgicas e berne (*Dermatobia hominis*). Cicatrização de feridas em geral, contaminadas ou não.

Posologia e modo de uso:

Agitar vigorosamente o frasco para homogeneizar o produto. Vaporizar a uma distância entre 10 e 20 cm do local afetado em dose única para profilaxia e durante 3 a 4 dias para tratamento. Mudanças na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco aerosol com 500 ml (290 g)



Unguento Vansil®

Larvicida, repelente e cicatrizante tópico

Indicações de uso:

Profilaxia e tratamento de miíases (larvas de *Cochliomyia hominivorax*), infecções de umbigo, abscessos, feridas cirúrgicas, pisaduras e castrações.

Posologia e modo de uso:

Aplicar uma fina camada sobre a região afetada diariamente até a cura completa.

Apresentação:

Frasco com 250 g



Ricinus®

Hidratante e estimulante da epitelização

Indicação de uso:

Ricinus é indicado para auxiliar na cicatrização de feridas.

Modo de uso:

Aplicar uma fina camada sobre a pele do animal.

Apresentação:

Pote com 250 g e spray com 120 ml



1



2



3



FINAL

Cicatrizantol®

Pomada cicatrizante à base de sulfá

Indicações de uso:

Como cicatrizante e anti-séptico no tratamento de feridas, úlceras, fistulas e pisaduras.

Posologia e modo de uso:

Espalhar sobre o ferimento após prévia limpeza cuidadosa do mesmo.

Apresentação:

Bisnagas de 50 g



ESPECIALIDADES

Anestésico Vansil®

Lidocaína + Epinefrina

Indicações de uso:

Está indicado para casos em que é desejável inibir a dor em determinada região para tratamento e intervenções clínicas cirúrgicas. Produz rápida e extensa analgesia regional, não sendo irritante aos tecidos, nem causando lesão às estruturas nervosas da região.

Posologia e modo de uso:

Aplicar em injeções subcutâneas, infiltrações musculares, perineurais e epidurais, com a pele previamente higienizada e assepsada sob orientação do Médico Veterinário. Dose máxima: 9 mg / 1 kg de peso.

Apresentação:

Frasco com 50 ml



Tintura de Iodo 5%®

Solução desinfetante alcoólica à base de Iodo

Indicações:

Controle de bactérias (Gram + e -), protozoários, fungos e vírus (formas esporuladas e vegetativas) em instalações, equipamentos e instrumentos cirúrgicos. Antissepsia de pele para tratamento de feridas contaminadas.

Obs: Aplicar nas superfícies previamente higienizadas.

Posologia e modo de uso:

A utilização de cada concentração depende dos agentes contaminantes, das condições de limpeza das superfícies e tecidos a serem tratados, da natureza do material (plástico, metal, vidros, etc) e do tempo de exposição a que estes serão submetidos.

Apresentações:

Frascos com 250 ml e 1 litro



Iodofarm®

Desinfetante e detergente à base de Iodophor (2.6%)

Indicações de uso:

Desinfecção contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos.

Posologia e modo de uso:

100 ml / 2 litros de água: Imersão de instrumento cirúrgicos e I.A. durante 10 minutos.
1 litro / 500 litros de água: Solução para pedilúvios, rodolúvios e desinfecção das instalações, equipamentos e veículos.

Apresentação:

Frasco com 1 litro





Conecte-se conosco



www.vansil.com.br | 55 19 3583-1597