

UNIDADE DE NEGÓCIOS

AVES E SUÍNOS



VANSIL
saúde animal



SUMÁRIO



● ANESTÉSICO	
Anestésico Vansil	pg 4
● ANTI-INFLAMATÓRIO	
Silcort	pg 4
● ANTIMICROBIANO - ÁGUA E RAÇÃO	
Ampicil	pg 4
Aurotrim	pg 4
Enro Flec Líquido	pg 5
Lincosil	pg 5
Lincosil 44	pg 5
Neocolin Líquido	pg 5
Neocolin Premix	pg 5
Potensil 50	pg 6
ST-Mix	pg 6
Suistin 50	pg 6
● ANTIMICROBIANO - INJETÁVEL	
Agrosil PPU	pg 6
Enro Flec Injetável	pg 7
Fortlozin	pg 7
Gentasil	pg 7
Oxi Vansil LA	pg 7
Tridiazin	pg 8
● ANTIPARASITÁRIOS	
Albemax	pg 8
Ciromazin 1%	pg 8
Ivermectina Vansil Premix 0,6%	pg 8
Mebendasil	pg 8
Silverm	pg 9
● ANTIPARASITÁRIOS TÓPICO	
Max Prata	pg 9
Unguento Vansil	pg 9
● ANTIPROTOZOÁRIO	
Avecox	pg 9
Coczuril	pg 10
Sulfaquinoxalina Vansil	pg 10
● ANTISSÉPTICO	
Iodofarm	pg 10
● CICATRIZANTE	
Citrax	pg 11
● COMPLEXO	
Dexfer Reforçado	pg 11
● DESINFETANTE	
Glutasil 50	pg 11
Vancid 50	pg 12
● HIGIENE	
Seclimp	pg 12
● MOSQUICIDA	
Vetomil	pg 12
● NUTRIÇÃO - SUPLEMENTO	
Ascorsil C	pg 13
Eletrovitan	pg 13
Vitalmax	pg 13
Vitasil	pg 14
Vitasil Pig	pg 14

ANESTÉSICO

ANESTÉSICO VANSIL



Está indicado para casos em que é desejável inibir a dor em determinada região para tratamento e intervenções clínico cirúrgico. Produz rápida e extensa analgesia regional, não sendo irritante aos tecidos, nem causando lesão às estruturas nervosas da região.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Lidocaína (Cloridrato) 2 g
Epinefrina (Bitartarato) 2 mg
Veículo q.s.p. 100 ml

Modo de uso:

Aplicar em injeções subcutâneas, infiltrações musculares, perineurais e epidurais, com a pele previamente higienizada e assepsiada sob orientação do Médico Veterinário. Dose máxima: 9 mg / 1 kg de peso.

Apresentação: Frasco 50 ml

ANTI-INFLAMATÓRIO

SILCORT



Controle da dor, febre e inchaço nas enfermidades musculares, articulares e ósseas.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Acetato de Isoflupredona 200 mg
Veículo q.s.p. 100 ml

Modo de uso:

Indicado para Suínos, nas seguintes doses:
Via Intramuscular : 5 a 10 ml a cada 12 ou 24 horas.
Via intrasinovial: 2,5 a 10 ml

Apresentação: Frasco 10 ml

ANTIMICROBIANO - ÁGUA E RAÇÃO

AMPICIL



É um antibiótico de largo espectro, possuindo ação sobre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.

Fórmula:

Cada 100 g contém:
Ampicilina Anidra 10 g
Excipiente q.s.p. 100 g

Período de carência: Aves - Abate: 3 dias. /
Suínos - Abate: 5 dias.

Apresentação: Caixa 10 kg e saco 20 kg

Modo de uso:

Aves: administrar 10 mg a 20 mg por kg de peso vivo por dia, durante 3 a 5 dias consecutivos, sendo assim, 1 kg do produto trata 5.000 (20 mg) a 10.000 (10 mg) kg de peso vivo.

Suínos: administrar 2 kg do produto por tonelada de ração durante 5 a 10 dias consecutivos ou 1 kg do produto para 1.000 litros de água de bebida durante 5 dias consecutivos.

AUROTIRM



É indicado para o tratamento de doenças respiratórias e enterites em aves e suínos.

Fórmula:

Cada 100 g contém:
Clortetraciclina 10 g
Trimetoprim 1,5 g
Sulfadiazina 7,5 g
Excipiente q.s.p. 100 g

Modo de uso:

Frangos de cortes e Suínos: administrar 2 a 4 kg do produto por tonelada de ração durante 5 a 7 dias consecutivos.

Período de carência: Aves - Abate: 15 dias. /
Suínos - Abate: 15 dias.

Apresentação: Saco 25 kg

ENRO FLEC LÍQUIDO



É indicado contra as infecções das aves causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Enrofloxacino.....10 g

Veículo q.s.p100 ml

Modo de uso:

Administrar 10 mg/kg de peso ou 1 litro do produto para 1.000 litros de água, durante 5 dias consecutivos.

Período de carência: Aves: 7 dias.

Apresentação: Frasco 1 litro

LINCOSIL



Aves: Lincosil está indicado na prevenção e tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-positivas. Eficaz no tratamento de enterites inespecíficas e clostridioses.

Suínos: Tratamento da pneumonia micoplásmica, prevenção e tratamento da disenteria suína.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Lincomicina (Cloridrato).....4,4 g

Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Aves: administrar 1 a 2 kg do produto por tonelada de ração durante 10 dias consecutivos.

Suínos: administrar 1 a 5 kg do produto por tonelada de ração durante 10 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário.

Período de carência: Aves - Abate: 6 dias. /

Suínos - Abate: 6 dias.

Apresentação:

Saco 25 kg

LINCOSIL 44%



Indicado para melhoria do ganho de peso e eficiência alimentar em aves e suínos.

Composição básica do produto:

Lincomicina e Veículo q.s.p.

Modo de uso:

Frango de Corte: adicionar Lincosil 44 na proporção de 10 g (4,4 g de Lincomicina) por tonelada de ração em uso contínuo.

Suínos: adicionar Lincosil 44 na proporção de 50 g (22 g de Lincomicina) por tonelada de ração em uso contínuo.

Níveis de garantia por kg do produto:

Lincomicina.....440 g

Apresentação: Saco 10 kg

NEOCOLIN LÍQUIDO



É indicado na prevenção e tratamento de enterites bacterianas causadas por bactérias Gram-negativas e algumas bactérias Gram-positivas que acometem as aves.

Fórmula:

Cada ml contém:

Sulfato de Neomicina*50 mg

Veículo q.s.p1 ml

(*equivalente a 35 mg de Neomicina base.)

Modo de uso:

Diluir 1 litro do produto em 1.000 litros de água de bebida (suficiente para tratar 4.000 kg de peso, equivalente a 12,5 mg / kg de peso), durante 3 a 5 dias consecutivos.

Período de carência: Abate: 5 dias.

Apresentação:

Frasco 1 litro e galão 5 litros

NEOCOLIN PREMIX



Está indicado para prevenção e tratamento de diarreia e enterite bacteriana em suínos e aves.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Sulfato de Neomicina9,8 g

Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Administrar 1 a 2 kg do produto por tonelada de ração ou a critério do Médico Veterinário.

Período de carência: Aves - Abate: 5 dias. /

Suínos - Abate: 3 dias.

Apresentação: Saco 10 kg e 20 kg

POTENSIL 50



Potensil 50 é um produto à base de Fenoximetilpenicilina, indicado para o tratamento de enfermidades em frangos de corte, matrizes de frango de corte, perus e suínos.

Fórmula:

Cada 100 g contém:
Fenoximetilpenicilina (Penicilina V Potássica).....50 g
Veículo q.s.p.....100 g

Apresentação: Caixa 2 kg com 20 saches 100 g, caixa 5 kg com 50 saches 100 g, saco 10 kg.

Modo de uso:

Via ração ou água de bebida na dose diária de 10 mg de Fenoximetilpenicilina por kg de peso, por um período de 5 a 7 dias consecutivos.

Dose prática: 100 g do produto trata 5.000 kg de peso vivo.
Ração: 200 ppm. Água: 100 g por 1.000 litros.

Período de carência: Aves - Abate: 12 horas. /
Suínos - Abate: 12 horas.

ST-MIX



Associação que possui alta eficácia em infecções causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. São igualmente indicadas em infecções intestinais, rinite atrófica, MMA, artrites, meningoencefalites e infecções urinárias.

Fórmula:

Cada 100 g contém:
Sulfametazina.....10 g
Trimetoprima.....2 g
Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Administrar 1,5 kg do produto por tonelada de ração durante 3 a 5 dias consecutivos.

Apresentação: Saco 5 kg.

Período de carência: Abate: 15 dias.

SUISTIN 50



Potente antimicrobiano bacteriostático à base de Tiamulina indicado para Suínos no tratamento da diarreia suína, colite espiroquetar, ileíte e pneumonia enzoótica e para Aves no tratamento de Doença Crônica Respiratória (DCR).

Fórmula:

Cada 100 g contém:
Tiamulina.....50 g
Veículo q.s.p.....100 g

Apresentação:

Caixa 1 kg com 10 sachês 100 g, caixa 5 kg com 50 sachês 100 g, caixa 10 kg com 100 sachês 100 g e Saco 20 kg.

Modo de uso:

Suínos: Água: Administrar 10 mg de Tiamulina por kg de peso, durante 07 dias consecutivos. Ração: Administrar 200 a 400 g do produto por tonelada de ração que correspondem a 100 a 200 ppm respectivamente, durante 05 a 10 dias consecutivos.

Aves: Água: Administrar 20 mg de Tiamulina por kg de peso, durante 07 dias consecutivos. Ração: Administrar 400 a 800 g do produto por tonelada de ração que correspondem a 200 a 400 ppm respectivamente, durante 05 a 10 dias consecutivos.

Período de carência: Aves - Abate: 10 dias. / Suínos - Abate: 4 dias.

ANTIMICROBIANO - INJETÁVEL

AGROSIL PPU



Tratamento de infecções bacterianas dos suínos.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Benzilpenicilina Procaína.....15.000.000 UI
Benzilpenicilina Benzatina.....10.000.000 UI
Di-hidroestreptomicina.....34,12 g
Veículo q. s. p.....100 ml

Observação:

Quando o volume de aplicação for superior a 20ml, recomenda-se aplicar em locais diferentes.

Modo de uso:

Agitar a suspensão e administrar por via intramuscular 1 ml para cada 20 kg de peso, em dose única ou a critério do Médico Veterinário.

Período de carência: Abate: 30 dias.

Apresentação: Frasco 50 ml e 100 ml.

ENRO FLEC INJETÁVEL



É indicado contra infecções causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Enrofloxacino.....10 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Apresentação: Frasco 500 ml

Modo de uso:

Administrar 1,0 ml para cada 40 kg de peso vivo durante 3 dias consecutivos.

Observações: quando o volume de aplicação for superior a 10 ml, recomenda-se aplicar em locais diferentes.

Período de carência: **Abate:** 7 dias.

FORTLOZIN



Tratamento e profilaxia das infecções bacterianas em suínos.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Tilosina.....20 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Apresentação: Frasco 50 e 100 ml

Modo de uso:

0,5 a 1 ml / 20 kg diariamente durante 5 dias (Intramuscular)
Modificações nas doses a critério do Médico Veterinário.

Períodos de Carência:

Abate: 21 dias.

GENTASIL



Tratamento e controle de infecções do trato respiratório, urinário, genital e gastrointestinal.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Sulfato de Gentamicina.....4 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Apresentação:

Frasco 100 ml

Modo de uso: Administrar por via intramuscular ou subcutânea 1 ml para cada 10 kg de peso, 2 vezes ao dia, no primeiro dia e doses diárias nos dias subsequentes. Continuar o tratamento por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas e não exceder a 7 dias a duração do tratamento

Período de carência:

Abate: 40 dias.

OXI VANSIL LA



É indicado para o tratamento das infecções do sistema respiratório, gastrointestinal, urogenital, tegumentar, locomotor e hemoparasitoses

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Oxitetraciclina (Cloridrato).....20 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Período de carência:

Abate: 30 dias.

Modo de uso:

1 ml /10 kg de peso, com o máximo de 20 ml por local de aplicação. Nos casos de infecções graves repete-se a mesma dose após 3 dias.

Recomenda-se continuar o tratamento por 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

Apresentação:

Frasco 50 ml e 100 ml

TRIDIAZIN



Profilaxia das infecções cirúrgicas e tratamento de Pneumonias, Enterites, Mastites, Septicemias, Bronquite Infecciosa, Infecções Geniturinárias, Agalaxia Infecciosa e Infecções podais em bovinos, caprinos, equinos, suínos e ovinos, de origem bacteriana.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Sulfadiazina.....40 g

Trimetoprima.....8 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Apresentação:

Frasco 15 e 50 ml

Modo de uso:

1 ml / 30 kg de peso (Intramuscular) por 3 dias.

Período de carência:

Abate: 28 dias

ANTIPARASITÁRIOS

ALBEMAX 100



É um anti-helmíntico de amplo espectro à base de Albendazol indicado para o controle de vermes chatos (cestóides) e redondos (nematóides) nas aves.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Albendazol.....10 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Modo de uso:

Aves: tratamento de nematóides e cestóides: 10 mg de Albendazol por kg de peso, ou seja, 1 litro do produto para cada 10.000 kg de peso, durante 5 a 10 dias consecutivos. Repetir o tratamento após 21 dias se necessário.

Apresentação: Frasco 1 litro

Período de carência: Abate: 14 dias.

CIROMAZIN 1%



É um larvicida, inibidor de crescimento de moscas, à base de Ciromazina, indicado para o controle de infestações por moscas na avicultura, inibindo o desenvolvimento das larvas no esterco.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Ciromazina.....1 g

Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Administrar 500 g do produto por tonelada de ração em uso contínuo, durante 5 semanas. Suspender 5 semanas e voltar ao tratamento novamente por 5 semanas. Proceder assim sistematicamente até o término da temporada de maior incidência das moscas.

Apresentação: Saco 25 kg

Período de carência: Abate: 3 dias.

IVERMECTINA VANSIL PREMIX 0,6%



É um endectocida com amplo espectro de ação, podendo ser usado em todas as fases da criação, sendo eficaz no tratamento e controle dos principais parasitas dos suínos.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Ivermectina.....0,6 g

Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Administrar 333 g por tonelada de ração durante 7 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário

Apresentação: Saco 5 kg e 25 kg

Período de carência: Abate: 5 dias.

MEBENDASIL



É indicado no tratamento das verminoses gastrointestinais e pulmonares em aves e suínos causadas por Nematódeos (vermes redondos) e Cestódeos (vermes chatos).

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Mebendazol.....5 g

Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso: Administrar 600 g do produto por tonelada de ração durante 5 dias consecutivos para aves e 10 dias consecutivos para suínos.

Apresentação: Sachê 600 g, saco 12 kg e 20 kg

Período de carência: Aves - Abate: 14 dias. / **Suínos - Abate:** 14 dias.

SILVERM



É indicado para o tratamento das verminoses gastrointestinais e pulmonares dos suínos causadas por nematódeos.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Fembendazol.....4 g

Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Administrar 500 g do produto por tonelada de ração durante 5 a 10 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário.

Apresentação: Saco 5 kg e 25 kg

Período de carência: **Abate:** 14 dias.

ANTIPARASITÁRIO TÓPICO

MAX PRATA



Profilaxia e tratamento de miíases, infecções de umbigo, abscessos, feridas cirúrgicas e berne. Cicatrização de feridas em geral, contaminadas ou não.

Modo de uso: Agitar vigorosamente o frasco para homogeneizar o produto. Vaporizar a uma distância entre 10 e 20 cm do local afetado em dose única para profilaxia e durante 3 a 4 dias para tratamento. Mudanças na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação: Frasco 500 ml

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Alumínio.....5,0 g

Diclorvós.....1,6 g

Cipermetrina.....0,4 g

Sulfadiazina de Prata.....0,1g

Veículo q.s.p.....100 g

Propelente Butano (80%) Propano (20%)

UNGUENTO VANSIL



Profilaxia e tratamento de miíases (larvas de *Cochliomyia hominivorax*), infecções de umbigo, abscessos, descornas, feridas cirúrgicas, pisaduras e castrações.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Permetrina.....0,5 g

Óxido de Zinco.....20 g

Butóxido de Piperonila.....3,5 g

Veículo q.s.p.....100 g

Modo de uso:

Aplicar uma fina camada sobre a região afetada diariamente até a cura completa.

Apresentação:

Pote 250 g

ANTIPROTOZOÁRIO

AVECOX



SOMENTE 3 DIAS DE CARÊNCIA

É indicado para tratar a Coccidiose em frangos de corte.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Diclazuril.....1,3 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Modo de uso: Administrar 1 mg do produto por kg de peso (1 frasco trata 5.200 kg) ou 400 ml do produto para 1.000 a 2.000 litros de água durante 3 dias consecutivos. Deve-se agitar o produto e fazer uma pré-diluição de 400 ml do produto Avecox em 10 litros de água. Depois da pré-diluição, adicionar essa mistura em 1000 litro de água de bebida, durante um período de 3 dias consecutivos.

Apresentação:

Frasco 400 ml

Período de carência: **Abate:** 3 dias.

COCZURIL



É indicado na prevenção da Coccidiose em frangos de corte.

Composição básica do produto:

Diclazuril e excipiente q.s.p.

Níveis de garantia por kg do produto:

Diclazuril.....5,096 g

Modo de uso:

Administrar 200 g de Coczuril (1 g de Diclazuril) por tonelada de ração ou a critério do Técnico Especializado.

Período de carência: Abate: 5 dias.

Apresentação: Saco 20 kg

SULFAQUINOXALINA VANSIL



Profilaxia e tratamento da Coccidiose em aves. Controla *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. maxima* e *E. brunetti*.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Sulfaquinoxalina Sódica.....25 g

Veículo q.s.p.....100 g

Apresentação: Caixa 10 kg e saco 20 kg

Modo de uso: Uso oral diluído na água ou misturado à ração.

Coccidiose em frangos e galinhas: administrar 500 g para 1000 litros de água ou 1 kg por tonelada de ração. Alterações no modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Período de carência: Abate: 10 dias.

ANTISSÉPTICO

IODOFARM



Desinfecção contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Iodo.....2,6 g

Ácido Sulfúrico.....1 g

Ácido Fosfórico.....3 g

Iodeto de Potássio.....1,5 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Apresentação: Frasco 1 litro

Modo de uso:

100 ml / 2 litros de água: Imersão de instrumento cirúrgicos e I.A. durante 10 minutos.

100 ml/ 2,5 litros de água: Assepsia das mãos dos ordenhadores nas rotinas diárias.

1 litro / 500 litros de água: Solução para pedilúvios, rodolúvios e desinfecção das instalações, equipamentos e veículos.

CICATRIZANTE

CITRAX



Como cicatrizante e antisséptico das feridas cirúrgicas (castrações, descornas, marcações e tosquias) e cura de umbigo de recém nascidos.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Ácido Bórico.....	20 g
Óxido de Zinco	27 g
Excipiente q.s.p.....	100 g

Modo de uso:

Polvilhar diretamente sobre a região afetada diariamente até a cura completa.

Apresentação: Frasco 200 g e 2 kg

COMPLEXOS

DEXFER REFORÇADO



Tratamento e profilaxia das anemias ferroprivas.

Fórmula:

Cada ml contém:

Ferrodextrana.....	100 mg
Cianocobalamina (Vit. B12).....	50 mcg
Veículo q.s.p.	1 ml

Apresentação: Frasco 50 ml

Modo de uso:

Aplicações intramusculares nas dosagens de:

Leitões: 2,0 ml entre o 3º e o 5º dia de vida.

Porcas Gestantes: 5,0 a 6,0 ml, 20 a 30 dias antes do parto.

DESINFETANTE

GLUTASIL 50



Desinfetante a base de amônia quaternária e glutaraldeído, com potente ação bactericida e viricida.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Glutaraldeído.....	42,5 g
Cloreto de Benzalcônio.....	7,5 g
Veículo q.s.p.....	100 ml

Apresentação: Frasco 1 litro e bombona 20 litros.

Modo de uso:

As doses recomendadas para o Glutasil 50 são as seguintes, sendo 1 parte do Glutasil para o volume de água correspondente para cada aplicação:

- 1:1.000 a 1:2.000 - Desinfecção de instalação e equipamentos
- 1:2.000 - Pedilúvio e rodolúvio
- 1:1.000 a 1:1.500 - Pulverização de ambientes
- 1:1.000 - Desinfecção de ovos férteis, por imersão ou pulverização.

VANCID 50



Desinfetante a base de amônia quaternária, altamente efetivo contra bactérias (Gram-positiva e Gram-negativa), fungos, vírus e algas. Apresenta ainda propriedades detergentes.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Cloreto de N-Alquil-Benzil-Dimetil amônia.....50 g

Veículo q.s.p.....100 ml

Apresentação: Frasco 1 litro e bombona de 20 litros.

Modo de uso:

As concentrações de uso do Vancid 50 variam de acordo com sua indicação.

Via de regra, as diluições abaixo são eficazes para o fim a que se destinam:

1:10.000: Tratamento da água de bebida.

1:3.000: Imersão de equipamentos e utensílios.

1:2.500: Lavagem e desinfecção em geral.

1:1.000: Pulverização sobre aves.

1:1.000: Nebulização.

1:1.000: Desinfecção de ovos incubáveis

“Pulverizar sobre os ovos com spray de gota grossa.”

HIGIENE

SECLIMP



Seclimp é indicado para aplicação direta na pele dos leitões ao nascimento com o objetivo de secagem e limpeza da mesma.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Dióxido de Silício.....5 g

Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso:

O produto deve ser aplicado diretamente sobre a pele dos leitões em quantidade suficiente para secá-la.

Apresentação:

Saco 10 kg e 20 kg

MOSQUICIDA

VETOMIL



Controle ambiental de insetos como, *Musca domestica* e *Stomoxys calcitrans* (mosca dos estábulos) presentes em instalações Industriais (matadouros, laticínios, charqueadas e cortumes) e rurais (estábulo, coqueiras, pocilgas, granjas, etc). Controle de formigas domésticas.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Metomil.....1,25 g

Veículo.q.s.p.....100 ml

Modo de uso:

Agitar o produto para homogenizar a suspensão. Diluir 1 litro de Vetomil / 10 litros de água e pulverizar paredes, pisos e equipamentos. Utilizar a solução diluída por completo.

Apresentação:

Frascos 250 ml, 1 litro e 5 litros

NUTRIÇÃO - SUPLEMENTO

ASCORSIL C



É indicado na suplementação de Vitamina C para aves.

Composição Básica do Produto:

Vitamina C e água.

Modo de uso:

Administrar 200 ml do produto para 1000 litros de água.

Níveis de Garantia por kg do Produto:

Vitamina C (mínimo).....175 g

Apresentação:

Frasco 200 ml, 1 litro e 5 litros.

ELETROVITAN



Eletrovitan está indicado para aves de todas as idades em casos que necessitem de suporte vitamínico, aminoácido e hidratante.

Composição Básica do Produto:

Ácido Fólico, Pantotenato de Cálcio, Citrato de Colina, Cloreto de Potássio, Cloreto de Sódio, Inositol, L-Lisina, Metionina, Nicotinamida, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12 e Veículo q.s.p.

Níveis de Garantia por kg do Produto:

Pantotenato de Cálcio	10 g
Ácido Fólico	300 mg
Citrato de Colina.....	60 g
Inositol	15 g
L-Lisina.....	75 g
Metionina	200 g
Nicotinamida.....	9.000 mg
Potássio	30 g
Sódio.....	100 g
Vitamina B1.....	3.000 mg
Vitamina B2.....	800 mg
Vitamina B6	2.970 mg
Vitamina B12	4.000 mcg
Vitamina C	11,8 g

Modo de uso:

Administrar 100 g do produto para 1.000 litros de água por um período de 4 a 7 dias ininterruptos. Repetir a utilização sempre que necessário. A água de bebida deve ser renovada diariamente.

Apresentação:

Caixa com 50 sachês 100 g

VITALMAX



É indicado para aves e suínos que necessitem de suporte vitamínico-aminoácido como estresse e debilidade orgânica.

Composição Básica do Produto:

Ácido Fólico; Cloreto de Colina; Cloreto de Potássio; Cloreto de Sódio; Inositol; Metionina; Nicotinamida; Pantotenato de Cálcio; Vitamina A; Vitamina B1; Vitamina B12; Vitamina B2; Vitamina B6; Vitamina D e Vitamina E.

Níveis de Garantia por kg do Produto:

Ácido Fólico.....	300 mg
Pantotenato de Cálcio.....	10 g
Colina.....	125 g
Inositol	15 g
Metionina.....	200 g
Nicotinamida.....	22,5 g
Potássio.....	10 g
Sódio.....	31 g
Vitamina A.....	8.000.000 UI
Vitamina B1.....	12 g
Vitamina B12.....	30.000 mcg
Vitamina B2.....	2.250 mg
Vitamina B6.....	6.000 mg
Vitamina D.....	160.000 UI
Vitamina E.....	10.000 UI

Modo de uso:

Administrar 250 g do produto em 1.000 litros de água de bebida ou 500 g do produto por tonelada de ração, durante 3 a 5 dias consecutivos. Alterações no modo de uso a critério do Técnico Especializado.

Apresentação:

Caixa 24 sachês 250 g

VITASIL



É indicado para aves auxiliando no índice de produção, fertilidade e eclosão dos ovos, crescimento, situações de estresse e como suporte vitamínico.

Composição Básica do Produto:

Ácido Fólico, Metionina, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina K3, Cloreto de Colina, L-Lisina e Veículo q.s.p.

Níveis de Garantia por kg do Produto:

Ácido Fólico	50 mg
Colina	50 g
L-lisina	30 g
Metionina	80 g
Vitamina B1	3.000 mg
Vitamina B12	4.000 mcg
Vitamina B2	1.000 mg
Vitamina B6	1.500 mg
Vitamina C	2.000 mg
Vitamina K3	2.000 mg

Modo de uso:

Administrar 1 litro do produto para 1.000 litros de água de bebida.

Apresentação:

Frasco de 1 litro e galão de 5 litros

VITASIL PIG



É indicado na suplementação vitamínica e aminoácida de leitões nas primeiras semanas de vida.

Composição Básica do Produto:

Ácido Fólico, Aroma de Banana, Citrato de Colina, Glicose, L-Lisina, Metionina, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina K3 e Veículo q.s.p.

Níveis de Garantia por kg do Produto:

Ácido Fólico.....	50 mg
Colina.....	50 g
Glicose.....	200 g
L-Lisina.....	30 g
Metionina.....	80 g
Vitamina B1.....	3.000 mg
Vitamina B2.....	1.000 mg
Vitamina B6.....	1.500 mg
Vitamina B12	4.000 mcg
Vitamina C.....	2.000 mg
Vitamina K3.....	2.000 mg

Modo de uso:

Administrar 1 a 2 ml do produto para cada 4 kg de peso vivo durante 7 dias consecutivos.

Na água: administrar 1 litro do produto em 500 litros de água durante 7 dias consecutivos. Alterações no modo de uso a critério do Técnico Especializado.

Apresentação:

Frasco Pig Doser 250 ml, 1 litro e galão 5 litros

Sob o nosso
Cuidado

VANSIL
saúde animal

CONECTE-SE COM A GENTE



www.vansil.com.br



Vansil Indústria Comércio e Representações Ltda.
R. João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado / SP
CEP 13690-000

www.vansil.com.br
Tel 19 3593 9999

CONECTE-SE COM A GENTE



www.vansil.com.br