

CATÁLOGO Animais de Companhia PET



CÃES, GATOS E PÁSSAROS



Vansil
saúde animal



SHAMPOO ECTO-LIN

Shampoo ectoparasiticida para cães, à base de Permetrina



Benefícios e Indicações

- Combate carrapatos
- Controla pulgas e piolhos
- Auxilia no controle de sarnas
- Efeito knockdown

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Permetrina0,04 g
Lauril Sulfato de Sódio.....10 g
Veículo q.s.p.....100 mL

Modo de uso:
Aplicar sobre os pelos umedecidos, massageando até alcançar uma espuma homogênea em todo o corpo do animal. Aguardar alguns minutos para atuação do produto e enxaguar em seguida. Repetir a operação por 2 a 3 dias, ou até que se eliminem os ectoparasitas.

Apresentação:
Frasco 300 mL

MAX PRATA

Larvicida, repelente, cicatrizante, antisséptico e hemostático



Benefícios e Indicações

- Pó superaderente de ação prolongada
- Controla miíase (bicheira)
- Bernicida
- Rápida cicatrização
- Válvula 360°

Fórmula:
Cada 100 g de concentrado contém:
Sulfadiazina de Prata.....0,1 g
Diclorvós.....1,6 g
Cipermetrina.....0,4 g
Alumínio.....5,0 g
Veículo q.s.p.....100 g
Propelente: Butano/Propano.....80:20

Modo de uso:
Agite energicamente o frasco e vaporize a uma distância entre 10 e 20 cm, dentro da ferida e nas suas bordas, recobrimdo toda a área.

Apresentação:
Frasco 200 mL (116 g)

UNGUENTO PLUS

Larvicida, repelente e cicatrizante



Benefícios e Indicações

- Ação repelente
- Cicatrizante
- Controla miíase (bicheira) e berne
- Pomada com textura macia de fácil aplicação
- Não resseca a pele

Fórmula:
Cada 100 g contém:
Butóxido de Piperonila.....3,5 g
Permetrina0,5 g
Óxido de Zinco20 g
Veículo q.s.p.....100 g

Modo de uso:
Uso tópico: secar a ferida com uma gaze e aplicar o produto com o auxílio de uma espátula. Repetir a aplicação diariamente até completa cicatrização da ferida. Crostas devem ser removidas antes da aplicação da pomada. O produto deve ser aplicado durante todo o tempo que se fizer necessário, até completa cicatrização.

Apresentação:
Pote 50 g

CYPERMEIT

Controle de carrapatos e moscas (pulverização)



Benefícios e Indicações

- Piretroide à base de Cipermetrina
- Combate carrapatos, moscas, sarnas e piolhos

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Cipermetrina.....15 g
Veículo q.s.p.....100 mL

Posologia e modo de uso:
Pulverização de ambientes: diluir 3 mL do produto em 1 litro de água. Pulverizar as camas e os locais onde os animais costumam repousar.

Apresentação:
Frasco 20 mL

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

TOP GARD



Benefícios e Indicações

- Anti-helmíntico para cães e gatos, para controle nas verminoses causadas por nematódeos e cestódeos:

Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Toxacara canis, Toxacara cati, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina, Taenia hydatigena, Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Echinococcus multiloculares, Mesocestoides spp., Hydatigera taeniaeformis e Multiceps multiceps.

- Palatável sabor carne

- Dose prática: 1 comp. para 10 kg

Fórmula:
Cada comprimido de 660 mg contém:
Pamoato de Pirantel144 mg
Praziquantel50 mg
Excipiente q.s.p.660 mg

Posologia e modo de uso: Via oral, podendo ser administrado diretamente na boca do animal ou misturado aos alimentos. Utilizar 1 comprimido de Top Gard para cada 10 kg de peso, para cães e gatos, conforme tabela de dosagens:

PESO	DOSE
Até 5 kg	½ comprimido
De 6 a 10 kg	1 comprimido
De 11 a 15 kg	1 e ½ comprimidos
De 15 a 20 kg	2 comprimidos
De 21 a 25 kg	2 e ½ comprimidos
De 25 a 30 kg	3 comprimidos
De 31 a 35 kg	3 e ½ comprimidos
De 36 a 40 kg	4 comprimidos

Apresentação:
Caixa com blister 4 comprimidos
Display com 25 blisters 4 comprimidos

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

TERAPÊUTICOS



V- CORT

**Dexametasona oral,
para cães e gatos**

Benefícios e Indicações

- **Anti-inflamatório**
- **Antialérgico**
- **Antirreumático
(artrites e contusões)**
- **Combate o eczema de
verão de qualquer natureza**

Fórmula:

Cada comprimido contém:
Acetato de dexametasona.....0,5 mg
Excipiente q.s.p.....200 mg

Modo de uso:

Via oral, diretamente na boca do animal.
Cães: ½ a 3 comprimidos diários,
administrados em uma ou duas vezes.
Gatos: ½ a 1 comprimido diário,
administrado em uma ou duas vezes.
Duração do tratamento: 7 dias
consecutivos.

Alterações na posologia e modo de uso a
critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Cartucho 20 comprimidos



ALUMEX

**Pomada analgésica,
anti-inflamatória
e descongestionante**

Benefícios e Indicações

- **Alívio das dores musculares**
- **Luxações**
- **Artrites**
- **Entorses**
- **Mialgias**

Fórmula:

Cada 100 g contém:
Salicilato de Metila.....4 mL
Bálsamo do Peru.....3 g
Cânfora.....5 g
Sulfato de Alumínio e de Potássio.....4,29 g
Óxido de Zinco.....10 g
Excipiente q.s.p.....100 g

Modo de uso: Aplicar fina camada de
Alumex na área a ser tratada. Massagear
suavemente por tempo suficiente para o alívio
da sensação dolorosa. Repetir a aplicação 2
vezes ao dia até a recuperação do quadro.

Apresentação:

Bisnaga 30 g

SUPLEMENTO

CÁLCIO FOR SUSPENSÃO

**Suplemento vitamínico mineral
para cães**



Líquido palatável

Níveis de garantia por kg do produto

Cálcio (mínimo/máximo)	15,2/ 16 g
Flúor (máximo)	72 mg
Fósforo (mínimo)	7.200 mg
Vitamina A (mínimo)	250.000 UI
Vitamina B12 (mínimo)	5.000 mcg
Vitamina D3 (mínimo)	400.000 UI

Composição básica: aroma de baunilha,
cloreto de cálcio, fosfato bicálcico, vitamina A,
vitamina B12, vitamina D3 e veículo q.s.p.

Cálcio FOR suspensão

Modo de uso:

Filhotes de pequeno porte: Administrar por via
oral 5 a 10 mL do produto ao dia durante 20
dias consecutivos. Filhotes de médio porte:
Administrar por via oral 20 a 30 mL do produto
ao dia durante 20 dias consecutivos. Filhotes
de grande porte: Administrar por via oral 30 a
50 ml do produto ao dia, durante 20 dias
consecutivos. Fêmeas em lactação:
Administrar por via oral 30 mL do produto ao
dia, iniciando 3 dias antes da data prevista para
o parto até o desmame dos filhotes.

Apresentação:

Frasco 100 mL
Aroma de baunilha

Pássaros

AVECOX

**Coccidicida para pássaros
à base de Diclaruzila**

Indicações:

Avecox é indicado para tratar e prevenir as
coccidioses em pássaros, causadas por
Eimerias e ou *Iso sporas*.

Fórmula:

Diclazurila.....1,3 g
Veículo q.s.p.100 mL

Modo de uso:

Deve ser administrado pela via oral.
Pássaros: Diluir 3 gotas do produto em 50
mL de água de bebida ou 60 gotas por litro,
administrando durante 4 dias consecutivos.

Dose prática 1 frasco (15 mL) para 4 L de
água.

Alterações na posologia e modo de uso a
critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco de 15 mL



VITASIL PS

**Suplemento vitamínico e
aminoácido para pássaros.**

Indicações:

Auxiliar no índice de produção, na fertilidade e
eclosão dos ovos, no crescimento e nas
situações de estresse; dar suporte vitamínico.

Composição básica:

Ácido Fólico; Aroma de Banana; Cloreto de Colina; L-Lisina;
Metionina; Vitamina B1; Vitamina B12; Vitamina B2; Vitamina
B6; Vitamina C; Vitamina K3 e Veículo q.s.p.

Níveis de garantia por litro do produto:

Ácido Fólico (mínimo)	50 mg
Colina (mínimo)	50 g
L-Lisina (mínimo)	30 g
Metionina (mínimo)	80 g
Vitamina B1 (mínimo)	3000 mg
Vitamina B12 (mínimo)	4000 mg
Vitamina B2 (mínimo)	1000 mg
Vitamina B6 (mínimo)	1500 mg
Vitamina C (mínimo)	2000 mg
Vitamina K3 (mínimo)	2000 mg

Modo de uso:

Via oral. Administrar 3 gotas do produto em 100 ml de água
durante 7 a 10 dias consecutivos.
Dose prática 1 frasco (15 mL) para 11,5 L de água.

Alterações no modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco de 15 mL

Pássaros

CRIASIL FERRO



Suplemento à base de Ferro para pássaros

Indicações:

Criasil Ferro é indicado na suplementação de pássaros de todas as idades.

Composição básica:

Ácido Fólico; Nicotinamida; Sulfato de Cobre Monohidratado; Sulfato Ferroso Monohidratado; Vitamina A; Vitamina B1; Vitamina B6; Vitamina D3; Vitamina E; Vitamina K3 e Veículo q.s.p.

Níveis de garantia por litro do produto:

Ácido Fólico (mínimo).....	201,6 mg
Cobre (mínimo).....	980 mg
Ferro (mínimo).....	17,05 g
Nicotinamida (mínimo).....	9.108 mg
Vitamina A (mínimo).....	600.000 UI
Vitamina B1 (mínimo).....	4.900 mg
Vitamina B6 (mínimo).....	1.980 mg
Vitamina D3 (mínimo).....	100 UI
Vitamina E (mínimo).....	250 UI
Vitamina K3 (mínimo).....	4.800 mg

Modo de uso:

Viagens, competições e exposições: Administrar 1 ml do produto (26 gotas) em 1 litro de água de bebida e fornecer as aves durante 5 dias consecutivos, repetindo 1 vez por mês.

Aves de pequeno porte (canários, coleiros, periquitos, curiós): 3 a 5 gotas em 40 ml de água de bebida durante 7 dias consecutivos e se necessário repetir após 30 dias. Dose prática 1 frasco (15 ml) para 4 L de água.

Aves de grande porte (papagaios, araras, pombos): 5 a 8 gotas em 40 ml de água de bebida durante 7 dias consecutivos e se necessário repetir após 30 dias. Dose prática 1 frasco (15 ml) para 2,5 L de água.

Alterações no modo de uso a critério do Técnico Especializado.

Apresentação:

Frasco de 15 mL

CRIASIL CÁLCIO



Suplemento mineral e vitamínico para pássaros

Indicações:

Criasil Cálcio é indicado na suplementação de cálcio em pássaros de todas as idades em fases de crescimento, postura, muda e acasalamento.

Composição básica:

Cloreto de Cálcio; Cloreto de Sódio; Fosfato de Cálcio; Vitamina D3 e Veículo q.s.p.

Níveis de garantia por litro do produto:

Cálcio (mínimo/máximo).....	10/11 g
Sódio (mínimo).....	3.800 mg
Vitamina D3 (mínimo).....	10.000 UI

Modo de uso:

Via oral. Administrar 1 ml ou 20 gotas do produto em 50 ml na água de bebida durante 20 dias consecutivos.

Dose prática 1 frasco (15 mL) para 1 L de água.

Alterações no modo de uso a critério do Técnico Especializado.

Apresentação:

Frasco de 15 mL

CRIASIL REPRODUÇÃO E

Vitamina E para pássaros



Indicações:

Criasil Reprodução está indicado para a suplementação de vitamina E em pássaros.

Composição básica:

Aroma de Banana; Vitamina E e Veículo q.s.p.

Níveis de garantia por litro do produto:

Vitamina E (mínimo).....	15.000 UI
--------------------------	-----------

Modo de uso:

Pássaros de pequeno porte: Fornecer 3 gotas em 50 ml de água durante 15 consecutivos.

Dose prática 1 frasco (15 mL) para 9 L de água.

Pássaros de grande porte: Fornecer 5 a 8 gotas em 50 ml de água durante 15 dias consecutivos. Renovar a água diariamente.

Dose prática 1 frasco (15 mL) para 4 L de água.

Apresentação:

Frasco de 15 mL

SULFAQUINOXALINA LÍQUIDA



O controle da coccidiose em pássaros

Indicações:

Para aves ornamentais no tratamento e profilaxia da Coccidiose, no tratamento do Tifo Aviário, Coriza Infectiosa e Cólera Aviária.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:	
Sulfaquinoxalina Sódica.....	20 g
Veículo q.s.p.....	100 ml

Modo de uso:

Via oral. Tratamento individual: administrar 2,5 ml do produto em 1 litro de água durante 3 dias consecutivos, descansar 2 dias e repetir se necessário.

Observação: cada ml corresponde a 20 gotas do frasco goteador.

Dose prática 1 frasco (10 ml) para 4 L de água.

Profilaxia: usar a metade da dose recomendada durante uma semana. Renovar a água a cada 24 horas.

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco de 10 mL

NEOCOLIN



Antibiótico oral para pássaros à base de Neomicina

Indicações:

Neocolin Líquido está indicado na prevenção e tratamento da diarreia bacteriana em pássaros e aves silvestres, provocadas por germes sensíveis à Neomicina, tais como:

Escherichia coli, *Proteus* sp, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus* spp e *Staphylococcus* sp.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:	
Sulfato de Neomicina*.....	50 mg
Veículo q.s.p.....	1 ml
*Equivalente a 35 mg de Neomicina base	

Modo de uso:

Via oral. Aves ornamentais: 5 gotas em 50 ml de água de bebida e fornecer durante 5 dias consecutivos.

Dose prática 1 frasco (10 ml) para 2,5 L de água.

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco de 10 mL

ENROFLEC



Antibiótico para aves em geral

Indicações:

Enroflec é indicado no tratamento das infecções causadas por bactérias Gram negativas, Gram positivas, Espiroquetas e Micoplasmas, em pássaros ornamentais.

Fórmula:

Cada ml contém:	
Enrofloxacino.....	100 mg
Veículo q.s.p.....	1 ml

Modo de uso:

Via oral. Pássaros e aves ornamentais: 1 ml (30 gotas) por litro de água de bebida ou 2 ml (60 gotas) para cada kg de alimento sólido (farinhada) durante 3 dias consecutivos. No caso específico de Salmonelose, o tratamento deve ser de 5 dias consecutivos.

Dose prática 1 frasco (10 ml) para 9 L de água.

Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco de 10 mL

CRIASIL PROBIÓTICO



•Equilíbrio da Flora Intestinal

Indicações:

É um aditivo que contribui para o equilíbrio da microbiota do trato digestório dos pássaros.

Composição básica:

Saccharomyces cerevisiae e Vitamina C

Níveis de garantia por kg do produto:

<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	990 x 10 ⁹ UFC
Vitamina C.....	10 mg

Modo de uso:

Via oral. Deve ser fornecido aos pássaros continuamente misturado no alimento na proporção de 2 g para cada 100 g de alimento. E um frasco 30 g para 1,5 kg de alimento (farinhada).

Apresentação:

Pote com 30 g

CRIASIL CORES



Aditivo pigmentante. Cores intensas

Indicações:

Aditivo pigmentante destinado para a alimentação de pássaros, com a função de colorir penas.

Composição básica:

Cantaxantina

Níveis de garantia por kg do produto:

Cantaxantina.....	990 g
-------------------	-------

Modo de uso:

Via oral. Adicionar 1,5 gramas do produto para cada 100 g de alimento (farinhada), em uso contínuo.

Apresentação:

Sachê 1,5 g

Vansil
saúde animal

CONECTE-SE COM A GENTE



www.vansil.com.br